

Wildbacher später

Vass8R10s141-145



Collection Vassal-Montpellier

OMtp1219


Wildbacher
später
8 R 10 s 141-145

Wildbacher später FH

8 R 10 s 141-145







ANNEE 1991

NOM Wildbacher später
ni

EMPLACEMENT 8 Rq 10 144. 145

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	3	13.3	21.3	7	23	30.5	3-5 +3	10.6	29.7	2.8 +1	6.8	2.9 +3

Grappe : G - M - P Dim : 11 Compacité : L - M - C
 Pour : 0 Mill : 0
 Baie : TG - G - M - P Dim : 15x14
 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
 Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré
 Saveur : s - m - ar - fox - herb
 Pépins : avec - apyrène
 Port : enge Vigueur : 1,5

ANNEE 1992

NOM ~~Confiance non~~ Wildbacher später
ni

EMPLACEMENT 8 Rq 10 144. 145

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	f				15	18.5	21.5	26.5	1.8	6.8	17.8	14.9
2	2	10.3	13.3	3			-1			+2		+5

Grappe : G - M - P Dim : 10 Compacité : L - M - C
 Pour : 0 Mill : 3
 Baie : TG - G - M - P Dim : 14x13
 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
 Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré
 Saveur : s - m - ar - fox - herb
 Pépins : avec - apyrène
 Port : enge Vigueur : 4

ANNEE 1993

NOM Wildbacher später
ni

EMPLACEMENT 8 R 10 s - 141.145

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1 f					30	20.5	22.5	26.5	27.7	1.8	9.8	6.9
2	2	2.3	9.3	6			-8			+2		+4
3												
4 f												
5 f												

Grappe : G - M - (P) Dim : Compacité: L - M (C)

Pour : 0 Mill : 0

Baie : TG - G - M - (P) Dim : 14

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : Vigueur :

16 8.3.93
-12

N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

Wildbacher spater

el 8 R 10 s 141-145 (s. 145)

(A) BOURGEONNEMENT

Epanoui (182) - moyen 183 - globuleux 184.

Glabre 185 - sétueux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux (189) -
cotonneux 190 - sans villosité pubescente (278) - sans villosité
laineuse 279.

Blanc 191 - fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 -
jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzé
ou cuivré 197 - vert (198) ^{jaune}

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Etalées - en gouttière - autres.

Face inférieure : glabres 199 - sétueuses 200 - veloutées 201 -
aranéuses 202 - duveteuses (203) - cotonneuses (204) - sans villosité
pubescente (280) - sans villosité laineuse 281.

Face supérieure : blanches 205 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 -
à liséré carminé 208 - jaune 209 - à ^{3^e}plages bronzées ou cuivrées (210) -
entièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes (212) ^{jaune} - autres 213.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé,
la couleur de la 2^{ème} et de la 3^{ème} feuille détachées sera notée).

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Face inférieure

Nervures : glabre 214 - sétueux (215) ^{lév.} - velouté 216 - aranéeux (217) -
duveteux 218 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282 -
sans villosité laineuse (283).

Limbe : glabre 220 - sétueux 221 - velouté 222 - aranéeux (223) -
duveteux (224) - cotonneux 225 - sans villosité pubescente 284 -
sans villosité laineuse (285).

A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 -
jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou
cuivrées 232 - verte (233).

A pétiole glabre 234 - sétueux (235) - velouté 236 - aranéeux (237) ^{lév.} -
duveteux 238 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente (286) - sans
villosité laineuse (287).

Totalement - sillonné - partiellement.

Calvo 86

N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

Wildbacher Hater

8 R 10 s - 141-145 (s. 2)

un peu faible

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - côtelé.

Glabre 242 - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 -
sêteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241.
sans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289.

Entièrement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies 249 - vert 250.

ventre coloré 251 - à raies 252 - vert 253.

Noeuds : dos coloré 254 - à raies 255 - vert 256.

ventre coloré 257 - à raies 258 - vert 259.

Vrille : verte 260 - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge foncé 263.

subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - moyenne - longue - très longue.

Bourgeon : coloré 264 - vert 265.

(I) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit.

Morphologiquement : mâle 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

Calvo 88

N° d'ordre :
Désignation :
Emplacement :

Wildbacher späte

8 R 105-141-145 (4-5)

(feuille)

FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 142 - grande 143.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - sétueux - velouté -
aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - sétueux 145 - velouté 146 -
aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 -
sans villosité pubescente 272 - sans villosité
laineuse 273.

limbe : glabre 150 - sétueux 151 - velouté 152 -
aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 -
sans villosité pubescente 274 - sans villosité
laineuse 275.

Limbe : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Lobes : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface : unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyenne-
ment bullée 159 - grossièrement bullée 159 - gauffrée 160 -
plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 -
partiellement rouge 165 - entièrement
rouge 166.

Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 -
entièrement rouge 169.

point
au point
pétiolaire

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

PETIOLE

Long 170 - moyen 171 - court 172.

Glabre 173 - sétueux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 -
sillon - partiellement - totalement.

Coloré 176 - partiellement coloré 177 - vert 178.

Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277 -
partiellement - totalement.

Calvo 89

N° d'ordre :

Wildbacher spater

Désignation :

Emplacement :

8 R 100-141-145a.2

GRAPPE

Grosse 68 - Moyenne 69 - Petite 70 (dimensions 40 x).

Lâche 71 - Moyenne 72 - Compacte 73.

A pédoncule non visible 74 - visible 75 - long 76.

A pédoncule herbacé 77 - mi-aoûté 78 - aoûté jusqu'à la première ramification 79.

Axe de la rafle coloré 80 - non coloré 81.

BAIE

Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne 84 - Petite 85 - Très petite 86 - de taille régulière - irrégulière (dimensions : x).

De couleur blanc 87 - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 91.

Très pruinée 92 - pruinée 93 - non pruinée 94.

Coloration régulière - irrégulière.

Forme : discoïde 95 - sphéroïde 96 - ellipsoïde 97 - ovoïde 98 - troncovoïde 99 - obovoïde 100 - cylindroïde 101 - fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104.

A jus incolore 105 - coloré 106.

A ombilic très apparent - peu apparent.

A section transversale : régulière 107 - irrégulière 108 - côtelée 109.

Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée 111.

A saveur neutre 112 - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 - herbacée 117 - spéciale 118.

De séparation facile (égrenueuse) - difficile.

A pédicelle long 119 - moyen 120 - court 121.

A pédicelle de couleur : verte 122 - rouge 123 - irrégulière 124.

A bourrelet de couleur verte 125 - rouge 126 - irrégulière 127.

A bourrelet évident 128 - peu apparent 129.

A pinceau : court 130 - moyen 131 - long 132.

A pinceau : coloré 133 - non coloré 134.

A peau fine 135 - moyenne 136 - épaisse 137.

A pulpe charnue 138 - juteuse 139 - molle 140 - peu juteuse.

Avec pépins - apyrène.

Calvo 92

° d'ordre : *Wildbacher spater*
ésignation :
mplacement : *8 R 10 1 141. 145 -*

Angle des nervures : 1 - (2) - (3)
Sexe : 4 - 5 - (6)
1/L : (7) - 8 - 9
2/L : 10 - (11)
Nombre de lobes : (12) - (13) - 14 - 15 - 16
Prof. sinus latéral Sup. : (17) - (18) - (19) - 20
Prof. sinus latéral Inf. : (21) - 22 - 23 - 24
Forme sinus pétiolaire : (25) - (26) - 27 - 28 - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266
Sinus pétiolaire ouvert : (267)
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
Forme sinus latéral Sup. : (31) - (32) - 33 - 34 - (35) - 36 - 37 - (38) - 39
Fond sinus latéral Sup. en V : (268) - en U : (269) - autre : (270)
Sinus latéral Supérieur ouvert : (271)
Dents : forme : (40) - 41
Dents (angle) : (42) - 43 - 44
Angle du lobe terminal : 45 - 46 - (47)
Sinus pét. (dégar. - gar. - 1/2 dégar.) : 48 - (49) - 50
Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - (53) - (54) - 55 - 56 - 57 - 58 - 59
Angle des nervures L3 L'3 : (60) - 61 - 62
Largeur du sinus pétiolaire : (63) - 64 - 65 - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur
Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal
Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale
Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües